



Que faut-il faire en cas de traumatisme dentaire?

Tout signe de traumatisme crânien tels que perte de connaissance, nausée ou mal de tête, appelez immédiatement le 911.

QU'EST-CE QU'UNE DENT AVULSÉE?



Une dent avulsée est une dent qui a été complètement sortie de son alvéole. Vous **DEVEZ** agir rapidement pour augmenter les chances de sauvegarder la dent.

CE QU'IL FAUT FAIRE LORSQU'UNE DENT EST AVULSÉE

- Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un désinfectant pour les mains.
- Saisir la dent par la couronne; il s'agit de la partie utilisée pour mastiquer les aliments. Éviter de toucher ou de frotter la racine de la dent. Le tissu environnant est très délicat et il est important de le préserver.
- Rincer délicatement la dent avec de l'eau. Ne pas frotter, savonner ou assécher la dent.

DENT D'ADULTE

- Tenter de remettre la dent à sa place. Les chances de sauvegarder la dent sont meilleures si cela est effectué en moins de 10 minutes. Tenir la dent par la couronne et la remettre fermement en place dans l'alvéole (trou), la racine en premier. Mordre doucement dans un morceau de gaze ou de tissu propre.
- Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un désinfectant pour les mains.
- Si la dent ne peut pas être replacée immédiatement dans l'alvéole ou s'il y a un risque d'ingestion de la dent, déposer celle-ci dans du lait froid.
- Consulter un dentiste le plus rapidement possible.

DENT DE BÉBÉ

- La dent ne doit pas être réimplantée. La réimplantation d'une dent de bébé peut endommager la dent d'adulte en formation.
- Consulter un dentiste le plus rapidement possible.

