



SYPHILIS TREATMENT (BICILLIN® L-A) QUICK TIPS

The first-line agent for treatment of syphilis is **long-acting penicillin G benzathine** 2.4 million units (mu) IM (**Bicillin® L-A**). *Penicillin G sodium and other short-acting or controlled-release penicillins are NOT adequate to cure syphilis.*

Bicillin® L-A comes in pre-filled syringes.

Reconstitution is **NOT** required.


Each pre-filled syringe of Bicillin® L-A contains 1.2 million units of medication.




A complete dose of 2.4 million units IM requires TWO syringes.

Administer Bicillin® L-A as a divided dose of 1.2 million units IM bilaterally to the left and right **VENTROGLUTEAL** (preferred) muscle or **DORSOGLUTEAL** muscle only. **DO NOT** administer to the deltoid or quadriceps muscles. *For further information on landmarking, please refer to your clinical practice guidelines.*

VENTROGLUTEAL Landmarking (Preferred)



DORSOGLUTEAL Landmarking (Alternative)



Additional *Bicillin® L-A* product information (including monograph and patient resources) can be found on Pfizer Canada's [website](#).

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS (BICILLIN® L-A) INDICATIONS

Le médicament de première ligne pour le traitement de la syphilis est la **pénicilline G benzathine à action prolongée**, 2,4 millions d'unités (mu) IM (**Bicillin® L-A**). *La pénicilline G sodique et les autres pénicillines à courte durée d'action ou à libération contrôlée ne guérissent pas la syphilis.*

Bicillin® L-A se présente sous forme de seringues préremplies.

La reconstitution n'est **PAS** nécessaire (prêt à l'emploi).


Chaque seringue préremplie de Bicillin® L-A contient 1,2 million d'unités de médicament.




Une dose complète de 2,4 millions d'unités IM nécessite DEUX seringues.

Administrer Bicillin® L-A en dose divisée de 1,2 million d'unités IM bilatéralement dans les muscles **VENTROGLUTEAL** gauche et droit (de préférence) ou dans le muscle **DORSOFESSIER** uniquement. **NE PAS** administrer dans les muscles deltoïdes ou quadriceps. *Pour plus d'informations sur le repérage, veuillez vous référer à vos directives de pratique clinique.*

Repérage VENTROGLUTEAL
(De préférence)



Repérage DORSOFESSIER
(Second choix)



D'autres renseignements sur le produit Bicillin® L-A (y compris la monographie et les ressources pour les patients) sont disponibles sur [le site Web](#) de Pfizer Canada.

Adapté avec la permission du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

Mise à jour : avril 2024