

## من يحتاج إلى تلقي لقاح الحصبة؟



<p><b>لا يحتاجون للقاح</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• يمكن إعطاء جرعة واحدة من لقاح MMR* للأطفال الرضع المسافرين لمناطق يزداد بها خطر الإصابة بالعدوى.</li><li>• يجب أن يتلقى الأطفال الجرعتين الروتينييتين عند بلوغ 12 شهراً.</li></ul>	<p><b>الأطفال الرضع</b> <b>شهر 6-11</b></p>
<p><b>الجرعة الروتينية الأولى:</b></p> <p>يتلقى الأطفال جرعة من لقاح MMR* عند بلوغ عمر 12 شهراً.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• يوصى أن يتلقى الأطفال الذين يسافرون إلى مناطق يزداد بها خطر الإصابة بالعدوى الجرعة الثانية، حتى وإن لم يبلغوا عمر 4 سنوات بعد.</li></ul>	<p><b>الأطفال</b> <b>أعوام 1-3</b></p>
<p><b>الجرعة الروتينية الثانية:</b></p> <p>يتلقى الأطفال الجرعة الثانية من لقاح يشمل المناعة ضد الحصبة MMRV** ما بين عمر 4 و6 سنوات.</p>	<p><b>الأطفال</b> <b>4 سنوات فما فوق</b></p>
<p>كانوا قد تم تلقيحهم في مرحلة الطفولة. في حالة عدم التأكد من تلقي التلقيح، يوصى بإعطائهم جرعة واحدة من لقاح MMR* كما قد يحق لهم الحصول على جرعة ثانية.**</p>	<p><b>البالغون</b> <b>مواليد عام 1970</b> <b>أو ما بعده</b></p>
<p><b>المناعة الطبيعية:</b></p> <p>يعتبر الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1970 بشكل عام لديهم مناعة مكتسبة من تعرضهم لعدوى سابقة.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• قد يحق لهم الحصول على جرعة واحدة في حالة السفر إلى مناطق تزداد بها احتمالية الإصابة بالعدوى.</li></ul>	<p><b>البالغون</b> <b>من ولدوا قبل عام 1970</b></p>

\* MMR: اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

\*\* MMRV: اللقاح الرباعي ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وجديري الماء (الحماق).

\*\*\* للمزيد من المعلومات بما في ذلك الشروط المؤهلة لتلقي اللقاح، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني [OttawaPublicHealth.ca/Measles](http://OttawaPublicHealth.ca/Measles)