



谁需要接种麻疹疫苗？

婴儿 6-11个月	<p>不需要</p> <ul style="list-style-type: none">• 如果婴儿至高风险地区旅行，可能需要接种一剂麻腮风疫苗• 这位儿童仍须在满12个月后接种2剂常规疫苗
儿童 1-3岁	<p>第一剂常规疫苗： 儿童在12个月大时接种一剂麻腮风疫苗*</p> <ul style="list-style-type: none">• 至高风险地区旅行的儿童，即使未满4岁，仍建议接种第二剂
儿童 4岁以上	<p>第二剂常规疫苗： 儿童在4-6岁之间接种第二剂包含麻疹的疫苗，叫做麻腮风及水痘疫苗**</p>
成人 1970年或以后出生	<p>成人应该在儿童时期就接种过疫苗。如不确定其疫苗记录，则建议接种一剂麻腮风疫苗，并且他们也可能符合第二剂疫苗资格***</p>
成人 1970年以前出生	<p>自然免疫： 出生于1970年以前的人士通常视为曾经受过感染而有抗体</p> <ul style="list-style-type: none">• 至高风险地区旅行人士可能符合接种一剂资格

* 麻腮风：麻疹，腮腺炎及风疹

** 麻腮风及水痘：麻疹，腮腺炎，风疹及水痘

*** 如需了解更多信息，包括符合资格的条件，请访问我们的网站：OttawaPublicHealth.ca/Measles