



ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ (WNV) ਮੱਛਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ - ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਊਲੈਕਸ ਸ਼ਰੇਣੀ (Culex genus) ਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਵਾਂ (corvids) ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਡਰ ਕਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਕਾਂ, ਅਤੇ ਬਲੂ ਜੇਅ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਚਿੜੀਆਂ, ਸਧਾਰਨ ਮੈਨਾ (ਗ੍ਰੇਕਲ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰੋਬਿਨ (ਲਾਲ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ) ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ (ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ) ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਾਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਬਲਿਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ;
- ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦਾ ਅਕੜਾਅ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਸੁਰਤੀ, ਭੁਚਲਾਹਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ।
- ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉ:

- ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਡੀਟ” (DEET) ਜਾਂ “ਆਇਕਾਰਿਡਿਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
- ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਸੰਘਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ-ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਟਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ; ਮੱਛਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਅਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ - ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛਾਂਦਾਰ, ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ।

Punjabi - 08/2021



ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉ:

ਮੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਣਨ ਥਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੋ:

- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ/ਬਾਹਰ ਡੱਬੇ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿਉ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
 - » ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੇਡਿੰਗ ਪੂਲ (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪੂਲ)
 - » ਵੀਲਬੈਰੇ
 - » ਪੂਲ (ਤਲਾਅ) ਦੇ ਕਵਰ
 - » ਬਰਡ ਬਾਥ
 - » ਟਾਇਰ
 - » ਗਮਲਿਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਬਰਤਨ/ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ
- ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਰਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਕੱਢ ਦਿਉ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਡ ਬਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਜਾਵਟੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਵਾਉ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉ।
- ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉ।
- ਗੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ) ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ (ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨੀ) ਕਰੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਐਂਟਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਂਟਵਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ **613-580-6744** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ OttawaPublicHealth.ca/WestNileVirus ਵਿਖੇ ਜਾਉ